

DE REBUS HIDROBIOLOGICIS. XXXIII

# CATÁLOGO DE LOS LAGOS DE ESPAÑA

POR

L U I S P A R D O

HIDROBIÓLOGO DEL INSTITUTO FORESTAL DE INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS. Ex AYUDANTE POR OPOSICIÓN DEL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGÍA DE VALENCIA

PRÓLOGO DE

L U I S V É L A Z D E M E D R A N O

INSPECTOR GENERAL DE MONTES  
COLABORADOR DEL INSTITUTO

BIOLOGÍA DE LAS AGUAS CONTINENTALES

VI



MINISTERIO DE AGRICULTURA

INSTITUTO FORESTAL DE INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS

AÑO XIX

MADRID-1948

NÚM. 41

(SEPARATA DE LOS HUEMDALES DE LA JANDA)

**64. Alcalá (Laguna de).**

(CÁDIZ.)

*Localización:* Al NE. de Vejer de la Frontera 6,5 Km., junto a la Vereda de Cantarranas, 2,5 al O. del vértice Las Lomas; en ella nace el arroyo del Pilón.

*Características:* Esteparia.

*Morfometría:* De perímetro oval, con una longitud máxima de 350 m. y una igual anchura de 175; sus aguas son temporales.

*Bibliografía:* J. Dantín (148).

**128. Ánsares (Charco de los).**

(CÁDIZ.)

Zona del Lago de la JANDA, que ocupa el sector N. de la parte central, y que por su mayor profundidad (5 m.) es el último trozo que conserva agua en la desecación estacional. Por estas razones, parece es el sitio predilecto de las grandes palmípedas, lo que ha dado motivo a que sea bautizado por los naturales de la comarca con el expresado nombre.

**218. Barbate (Marismas del).**

(CÁDIZ.)

*Localización:* En el tramo del río que las origina, desde 1,5 Km., al SE. de Vejer de la Frontera hasta su desembocadura.

*Características:* Fluvial.

*Morfometría:* De perímetro irregular, alcanzan la longitud máxima de 8 Km. por una igual anchura de 3.7.

**352. Cabrahigo (Lagunilla de).**

(CÁDIZ.)

*Localización:* Al NE. de Vejer de la Frontera, y 2,5 Km. al NE., también de la Laguna de ALCALÁ, da lugar al nacimiento del arroyo de igual nombre.

*Características:* Esteparia.

*Morfometría:* Diminuta laguna, cuya longitud es inferior a 100 m., pero con aguas permanentes.

*Bibliografía:* J. Dantín, (148).

**817. Espartina (Laguna de).**

(CÁDIZ.)

*Localización:* Entre el río Barbate, al E. y S., y la Vereda de Cantarranas al O., 1,7 Km. al N. del Lago de la JANDA, en su parte más amplia.

*Características:* Esteparia, salitrosa; es más bien un pantano, pero de considerable extensión.

*Morfometría:* De perímetro irregular, sus máximas longitud y anchura llegan a 3 y 1,7 Km., respectivamente; muy afectada por el estiaje.

*Bibliografía:* J. Dantín (148).

**1.089. Jaba (Laguna de la).**

(CÁDIZ.)

*Localización:* En el término municipal de Vejér de la Frontera, 3 Km. al oriente del extremo SE. del Lago de la JANDA, y muy cercana a la Cortijada de las Habas, a 80 m. de altura.

*Características:* Esteparia.

*Morfometría:* De perímetro oval, con una longitud máxima de 200 metros y aguas estacionales.

*Bibliografía:* J. Dantín (148).

**1.092. Janda (Lago o laguna de la).**

(CÁDIZ.)

*Localización:* En el término municipal de Vejér de la Frontera, la carretera de Cádiz a Málaga la bordea en su orilla meridional.

*Características:* Tectónico.

*Morfometría:* Su perímetro es sumamente irregular. En la época de aguas máximas alcanza una gran extensión, llegando hasta 40 Km.<sup>2</sup>; la longitud máxima (desde la salida del emisario o río Barbate, hasta la base del cerro Longuera, en el extremo oriental) mide 14,5 Km., y 6 la mayor anchura (desde el pie de Mesa Mediana a la loma de las Canteruelas); su fondo es llano y duro, con profundidad casi uniforme, que oscila entre 0,80 y 1,10 m., lo que permite vadearla fácilmente, excepto en el trozo llamado Charco de los ÁNSARES, donde alcanza la de 5, y en los álveos de los ríos que penetran en el lago. No obstante su extensión, a fines de estío se deseca totalmente, tardando más en la parte que, por esta razón, distinguen los naturales del país con el nombre de Laguna JANDILLA. Del lago emergen tres isletas.

*Biología:* La vegetación acuática es espesa, cubriendo la mayor parte de las aguas; dominan los juncos de gran porte, y la enea; el junca únicamente se presenta bordeado por el cañar en los senos donde la quietud de las aguas es mayor. Tan espléndidas formaciones hidrofíticas albergan una nutridísima fauna ornitológica, muy rica en formas e individuos de palmípedas y zancudas.

*Aprovechamiento:* La caza acuática practicada al acecho o en mano, cruzando el lago, y la utilización de la enea, que en primavera se desarrolla con extraordinaria rapidez. Recientemente (diciembre 1946) se ha decretado su desecación para convertirla en terrenos de cultivo.

*Folklore:* La batalla del Barbate, no del Guadalete, librada en sus orillas, ha inspirado leyendas y romances, aludiéndose al lago.

*Bibliografía:* "Aquila chrysaetus" (17), C. Arévalo (33), J. L. Bernaldo de Quirós (62), R. Campos (92 A), J. Dantín (148), J. España (181 A) y Enc. Espasa (182, tomo XXVIII, 2.<sup>a</sup> parte, pág. 2.449).

**1.093. Jandilla (Laguna de).**

(CÁDIZ.)

*Localización:* Porción del Lago de la JANDA, que por resistir más a la desecación estival, designan con este nombre los naturales del país; ocupa el NO. del total del lago, entre la margen derecha del río Barbate y la orilla N., y el cerrillo de la Cabeza del Cañar al S.

*Morfometría:* De perímetro irregular, alcanzando sus máximas longitud y anchura, 3 y 1.7 Km., respectivamente.

En todo lo demás, es aplicable lo que se consigna al tratar del Lago de la Janda.

*Bibliografía:* Véase la del Lago de la Janda.

**1.953. Rehuelga (Laguna de).**

(CÁDIZ.)

*Localización:* Cerca del río Tragante, entre su orilla izquierda y la derecha del Celemín, que confluyen 1,5 Km. al SO. de la laguna, la cual está 5 Km. al N. de la de la JANDA.

*Características:* Esteparia.

*Morfometría:* De contorno circular irregular, su diámetro es de algo más de 700 m., siendo escasa su profundidad; con aguas temporales.

*Bibliografía:* J. Dantín (148).

**2.217. Tapatanilla (Laguna de).**

(CÁDIZ.)

*Localización:* Junto al Km. 56 de la carretera de Cádiz a Málaga, a 600 m. de la extremidad oriental de la Laguna de la JANDA, entre dicha carretera, al S., y el río Almodóvar, al N.

*Características:* Tectónica.

*Morfometría:* De contorno irregular, alcanza una longitud máxima de 900 m. y una igual anchura de 400; sus aguas son estacionales.

*Bibliografía:* J. Dantín (148).

**2.388. Vejer de la Frontera (Lagunas de).**

(CÁDIZ.)

En el término municipal de esta localidad afloran varias lagunas de diversas dimensiones y popularidad. Muy conocido es el Lago o Laguna de la Janda; no tanto las de Espartina, Tapatanilla y Rehuelga, y mucho menos, sobre todo designadas con sus respectivos nombres propios, las de Alcalá, Cabrahigo y la Jaba. (V. cada una de éstas.)